arXiv:1612.03543v1 [math.CO] 12 Dec 2016

Двойственность Саито и классическая теория арифметических функций

Г. Г. Ильюта

Аннотация. Мы изучаем двойственность Саито и преобразование Фурье-Рамануджана для степенных сумм и кратностей корней монодромии.

We study Saito duality and Fourier-Ramanujan transform for power sums and multiplicities of monodromy roots.

Содержание

1. Введение 1
2. Производящие функции для равномерных функций 7
3. Обобщённые степенные суммы и кратности корней 11
4. Эта-произведение Саито 18
5. Квазиоднородные особенности 19
6. Простые и параболические особенности 20
7. Исключительные особенности Арнольда 22
Список литературы 24

1. Введение

Дзета-функция и характеристический многочлен монодромии особенности представимы в виде

$$\zeta_e(q) := \prod_{d|n} (q^d - 1)^{e(d)} \tag{1}$$

Работа поддержана грантами РФФИ-16-01-00409 и НШ-5138.2014.1.

для некоторой целочисленной функции e, определённой на положительных делителях d фиксированного во всей статье натурального числа n [**1**]. Двойственная по Саито функция имеет вид [**17**]

$$\hat{\zeta}_e(q) := \prod_{d|n}(q^d-1)^{-e\left(\frac{n}{d}\right)}.$$

Нам будет более удобно рассматривать функцию

$$\zeta_e^*(q) := \hat{\zeta}_e^{-1}(q) = \prod_{d|n}(q^d-1)^{e\left(\frac{n}{d}\right)},$$

которую назовём преобразованием Саито функции $\zeta_e(q)$. Мы изучаем действие преобразования Саито на (обобщённые) степенные суммы и кратности корней функции $\zeta_e(q)$, используя тот факт, что эти величины связаны с функцией e преобразованием Мёбиуса. Наш подход основан на следующем замечании. Используя формулы для циклотомических многочленов $\Phi_n(q)$ ($\mu(k)$ – функция Мёбиуса)

$$q^n-1 = \prod_{d|n}\Phi_d(q),$$

$$\Phi_n(q) = \prod_{d|n}(q^d-1)^{\mu\left(\frac{n}{d}\right)}, \tag{2}$$

рациональную функцию вида (1) можно представить как произведение многочленов $\Phi_d(q)$

$$\prod_{d|n}(q^d-1)^{e(d)} = \prod_{d|n}\Phi_d^{m\left(\frac{n}{d}\right)}(q). \tag{3}$$

Применяя логарифмическую производную к обеим частям этого равенства, получим утверждение о равномерных (even) арифметических функциях [**4**] – определённых на множестве целых чисел функциях $a(k)$, зависящих только от наибольшего общего делителя (k,n). А именно, в правой части формулы (3) равномерной является функция $m(k)$ – кратность корня $e^{\frac{2\pi ik}{n}}$ функции $\zeta_e(q)$, а в левой части после применения логарифмической производной появляется равномерная функция $p(k)$ – сумма k-х степеней корней функции $\zeta_e(q)$. Приведём некоторые утверждения о равномерных функциях (см. [**4**], [**5**], [**12**], [**20**]), которые будут использоваться ниже. Любая равномерная функция $a(k)$ имеет представление вида (формулы (9) и (10) для $m(k)$ и $p(k)$)

$$a(k) = \sum_{d|(k,n)} e(d), k \in \mathbb{Z}, \tag{4}$$

для некоторой функции $e(d)$, $d|n$, а также разложение Фурье-Рамануджана и его обращение

$$a(k) = \sum_{d|n} r\left(\frac{n}{d}\right) c_d(k), k \in \mathbb{Z}, \tag{5}$$

$$r(k) = \frac{1}{n} \sum_{d|n} a\left(\frac{n}{d}\right) c_d(k), k \in \mathbb{Z}, \tag{6}$$

другими словами, суммы Рамануджана

$$c_m(l) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,m)=1}}^{m} e^{\frac{2\pi i k l}{m}}, l \in \mathbb{Z},$$

для $m|n$ образуют базис в пространстве равномерных функций. Заметим, что равномерная функция $a(k)$ из формулы (4) представляет собой кратность корня 1 частичной дзета-функции

$$\zeta_e^{(k)}(q) := \sum_{d|(k,n)} (q^d - 1)^{e(d)}, k \in \mathbb{Z}.$$

Из равенств (5), (6) и формулы Рамануджана

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_n(k)}{k^s} = \zeta(s)\phi_{1-s}(n),$$

где

$$\phi_s(n) := \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) d^s,$$

вытекают равенства

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{a(k)}{k^s} = \zeta(s) \sum_{d|n} r\left(\frac{n}{d}\right) \phi_{1-s}(d), \tag{7}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{r(k)}{k^s} = \frac{\zeta(s)}{n} \sum_{d|n} a\left(\frac{n}{d}\right) \phi_{1-s}(d). \tag{8}$$

В §2 получены равенства для различных производящих функций последовательностей $m(k)$, $p(k)$ и $e(d)$. В частности, мы свяжем многочлены Апостола-Бернулли и Апостола-Эйлера с производящими функциями, которые являются q-степенными суммами показателей Кокстера в случае простых особенностей. В [**3**] степенные суммы показателей Кокстера представлены как специализации многочленов Тодда. В [**16**] К. Саито упоминает свой препринт 1985 года, в котором степенные суммы показателей регулярных весовых систем представлены как многочлены от весов. Степенным суммам

обобщённых показателей Кокстера (спектральных чисел особенности) посвящены статьи [**2**], [**8**].

При доказательстве формул из §2 используются равенства (7), (8) и следующее замечание: если две линейные комбинации линейно независимых функций равны, то равенство сохранится при замене этих функций на любые другие. Возможен другой единый подход к доказательству формул из §3: при умножении (делении) функций вида (1) соответствующие равенства складываются (вычитаются) и поэтому достаточно привести доказательство для $\zeta_e(q) = 1 - q^d$, $d|n$. Например, число $e^{\frac{2\pi ik}{n}}$ является корнем многочлена $q^{n/d} - 1$, $d|n$, если и только если $d|(k,n)$. Поэтому

$$m(k) = \sum_{d|(k,n)} e\left(\frac{n}{d}\right), k \in \mathbb{Z}. \tag{9}$$

Другой пример: по определению

$$p(k) = \sum_{d|n} e(d) \sum_{l=0}^{d-1} e^{\frac{2\pi ilk}{d}}, k \in \mathbb{Z},$$

и поэтому из соотношений ортогональности для характеров циклической группы C_d, $d|n$, вытекает равенство

$$p(k) = \sum_{d|(k,n)} de(d), k \in \mathbb{Z}. \tag{10}$$

Для функции $\zeta_e^*(q)$

$$m^*(k) := \sum_{d|(k,n)} e(d), k \in \mathbb{Z},$$

$$p^*(k) := \sum_{d|(k,n)} de\left(\frac{n}{d}\right), k \in \mathbb{Z}.$$

В §3 получены формулы перехода, связывающие обобщения функций $m(k)$, $p(k)$ и их преобразований Саито $m^*(k)$, $p^*(k)$. Обобщения определяются с помощью производящих функций для преобразования Мёбиуса – функция $(1-q)^{-1}$ и дзета-функция Римана $\zeta(s)$ в этих производящих функциях заменяются, соответственно, формальным степенным рядом и формальным рядом Дирихле. Такие обобщения позволяют учитывать в степенных суммах и кратностях только корни с предписанными свойствами. Отметим ещё одно направление для обобщений: в преобразовании Мёбиуса можно рассматривать суммирование по подмножеству делителей, например, регулярные свёртки Наркиевича [**12**].

В §4 содержится следствие формулы (3) для эта-произведения Саито. Для квазиоднородных особенностей в §5 приведены формулы для производящих функций последовательностей $m(k)$ и $p(k)$ (используется формула для функции $\zeta_e(q)$ из [**7**] и формула для многочлена $\sum_{k=0}^{n-1} m(k)q^k$ из [**22**]).

Корнями характеристического многочлена монодромии являются числа $e^{\frac{2\pi i m_j}{n}}$, где $m_j \in \mathbb{Z}$ – подходящим образом нормализованные спектральные числа особенности [**15**]. Отсюда следует, что

$$\sum_{k=0}^{n-1} m(k)q^k = \sum_j q^{m_j} \mod (q^n - 1),$$

в частности, для простых особенностей

$$\sum_{k=0}^{n-1} m(k)q^k = \sum_j q^{m_j}$$

и числа m_j совпадают с показателями Кокстера соответствующих конечных групп отражений. В §6 и §7 для простых, параболических и исключительных унимодальных особенностей приведены таблицы производящих функций последовательностей $m(k)$ и $p(k)$ (при этом используются таблицы функций $e(d)$ из [**17**]).

В [**9**] суммы Рамануджана интерпретированы как элементы таблицы суперхарактеров циклической группы C_n (любая теория суперхарактеров конечной группы определяются специального вида разложением регулярного характера, обычная теория характеров отвечает разложению на неприводимые). Равномерные функции являются функциями суперклассов сопряжённости в этой теории. В контексте формулы А'Кампо для дзета-функции циклическая группа C_n порождается оператором монодромии. В последние годы изучаются и более общие группы симметрий особенностей [**8**]. Интересно было бы понять роль суперхарактеров этих групп симметрий.

Мы предполагаем, что областью значений функции $e(d)$ является множество целых чисел $\mathbb{Z}$, но фактически нам понадобится только возможность рассматривать формальные линейные комбинации значений функции $e(d)$. Например, кратности и степенные суммы корней дзета-функции можно определить формулами (9) и (10), не заботясь о том, что собой представляют переменные $e(d)$. В формуле А'Кампо для дзета-функции монодромии [**1**] числа $e(d)$ являются эйлеровыми характеристиками некоторых многообразий. В

мотивных обобщениях дзета-функции А'Кампо функция $e(d)$ принимает значения в универсальном для эйлеровой характеристики объекте – кольце Гротендика алгебраических многообразий.

Записывая степенные суммы корней функции $\zeta_e(q)$ как суммы степеней всех корней степени n из единицы с кратностями, мы получим определение дискретного преобразования Фурье, которым связаны функции $p(k)$ и $m(k)$,

$$p(l) = \sum_{k=0}^{n-1} m(k) e^{\frac{2\pi i l k}{n}}$$

$$= \sum_{d|n} \sum_{(k,n)=d} m(k) e^{\frac{2\pi i l k/d}{n/d}}$$

$$= \sum_{d|n} m(d) \sum_{(k/d,n/d)=1} e^{\frac{2\pi i l k/d}{n/d}}$$

$$= \sum_{d|n} m(d) c_{n/d}(l) = \sum_{d|n} m(n/d) c_d(l), l \in \mathbb{Z}.$$

Заметим, что эти равенства равносильны равенству (3) – суммы Рамануджана $c_d(l)$, $l \in \mathbb{Z}$, являются степенными суммами корней многочлена $\Phi_d(q)$. Выбирая произвольно функцию e, мы видим, что полученные ниже формулы справедливы для любой пары равномерных функций, которые связаны дискретным преобразованием Фурье. Любая такая пара включается в семейство пар [**5**]: если

$$f_s(k) := \sum_{d|(k,n)} \frac{F(d, n/d)}{d^s}, f'_s(k) := \sum_{d|(k,n)} \frac{F(n/d, d)}{(n/d)^s},$$

то

$$f_s(k) = \sum_{d|n} f'_{s+1}(n/d) c_d(k), k \in \mathbb{Z}.$$

Преобразование Саито

$$m(k) \to m^*(k) : e(n/d) \to e(d)$$

и преобразование Фурье-Рамануджана (ограничение на пространство равномерных функций дискретного преобразования Фурье)

$$m(k) \to p(k) : e(n/d) \to de(d)$$

включаются в семейство преобразований

$$e(n/d) \to \frac{e(d)}{d^s}.$$

Полученные ниже формулы легко обобщаются для этих семейств как формулы перехода, связывающие различные их элементы (на

уровне производящих функций Дирихле такие переходы осуществляются с помощью подходящих сдвигов аргумента в рядах Дирихле, ниже мы используем сдвиги на 1). Например, можно использовать собранные в [**10**] разложения в ряды Дирихле для функций $G_1(s-k)/G_2(s)$ в Примерах 10-21, где используются разложения для функций $G_1(s-1)/G_2(s)$. Мы не будем этим заниматься подробно, но приведём следующий факт, указывающий на возможную связь с теоремой Себастьяни-Тома: характеристический многочлен монодромии прямой суммы особенностей равен тензорному произведению характеристических многочленов слагаемых. В формуле А'Кампо для дзета-функции монодромии [**1**] многочлен q^d-1 появляется как характеристический многочлен циклической d-перестановки.

Предложение 1. *Характеристический многочлен k-й тензорной степени циклической d-перестановки равен*

$$(q^d-1)^{d^{k-1}}.$$

Доказательство. Тензорному произведению линейных операторов соответствует тензорное произведение их характеристических многочленов $f\otimes g(q)$ – многочлен, корнями которого являются произведения корней многочленов $f(q)$ и $g(q)$. Хорошо известно, что тензорное произведение связано с результантом формулой

$$f\otimes g(q)=Res_t(t^m f\left(\frac{q}{t}\right),g(t)), m=\deg f.$$

Для k тензорных сомножителей по индукции имеем

$$(q^d-1)\otimes\cdots\otimes(q^d-1)=Res_t((q^d-t^d)^{d^{k-2}},q^d-1)$$
$$=\prod_{l=0}^{d-1}(q^d-(e^{\frac{2\pi il}{d}})^d)^{d^{k-2}}=(q^d-1)^{d^{k-1}}.$$

2. Производящие функции для равномерных функций

Известны следующие способы представления преобразования Мёбиуса $a(k)=\sum_{d|k}e(d)$, $k\in\mathbb{N}$, в виде соотношений между производящими функциями: представление ряда Ламберта в виде степенного ряда

$$\sum_{k=1}^{\infty}a(k)q^k=\sum_{m=1}^{\infty}\frac{e(m)q^m}{1-q^m} \tag{11}$$

и соотношение между рядами Дирихле

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a(k)}{k^s}=\zeta(s)\sum_{m=1}^{\infty}\frac{e(m)}{m^s}, \tag{12}$$

показывающее, что преобразование Мёбиуса последовательности отвечает умножению на дзета-функцию Римана соответствующей производящей функции Дирихле. Перепишем формулу (11) в более близком к формуле (12) виде

$$\sum_{k=1}^{\infty}a(k)q^k=\frac{1}{1-q}\sum_{m=1}^{\infty}\frac{e(m)q^m}{[m]_q},$$

где $[m]_q=1+q+\cdots+q^{m-1}$. Любая равномерная функция (7) является n-периодической и поэтому для неё формулы принимают вид

$$\sum_{k=1}^{\infty}a(k)q^k=\frac{\sum_{k=1}^{n}a(k)q^k}{1-q^n}=\sum_{d|n}\frac{e(d)q^d}{1-q^d}=\frac{1}{1-q}\sum_{d|n}\frac{e(d)q^d}{[d]_q}, \tag{13}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{a(k)}{k^s}=\zeta(s)\sum_{d|n}\frac{e(d)}{d^s}. \tag{14}$$

Многочлены Апостола-Бернулли $B_k(n,q)$ и Апостола-Эйлера $E_k(n,q)$ определяются производящими функциями **[21]**

$$\frac{te^{tx}}{qe^t-1}=\sum_{n=0}^{\infty}B_n(x,q)\frac{t^n}{n!},$$

$$\frac{2e^{tx}}{qe^t+1}=\sum_{n=0}^{\infty}E_n(x,q)\frac{t^n}{n!}.$$

Предложение 2. *Если*

$$a(k)=\sum_{d|(k,n)}e(d),k\in\mathbb{Z},$$

то

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1}a(k)q^k}{1-q^n}=\sum_{d|n}\frac{e(d)}{1-q^d}=\frac{1}{1-q}\sum_{d|n}\frac{e(d)}{[d]_q}, \tag{15}$$

$$\sum_{k=0}^{n-1}a(k)(bk+c)^rq^k=\sum_{d|n}\frac{e(d)(bd)^r}{r+1}\left(q^nB_{r+1}\left(\frac{c+bn}{bd},q^d\right)-B_{r+1}\left(\frac{c}{bd},q^d\right)\right),$$

$$\sum_{k=0}^{n-1}a(k)(bk+c)^r(-q)^k$$

$$= \sum_{2\nmid d|n} e(d)\frac{(bd)^r}{2}\left((-1)^{\frac{n}{d}-1}q^n E_r\left(\frac{c+bn}{bd},q^d\right) - E_r\left(\frac{c}{bd},q^d\right)\right)$$
$$+ \sum_{2|d|n} \frac{e(d)(bd)^r}{r+1}\left(q^n B_{r+1}\left(\frac{c+bn}{bd},q^d\right) - B_{r+1}\left(\frac{c}{bd},q^d\right)\right).$$

Доказательство. Используя равенство $a(0) = a(n) = \sum_{d|n} e(d)$ и формулу (13), получим

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1} a(k)q^k}{1-q^n} - \sum_{d|n} e(d) = \frac{-a(0) + a(n)q^n + \sum_{k=0}^{n-1} a(k)q^k}{1-q^n}$$
$$= \frac{\sum_{k=1}^{n} a(k)q^k}{1-q^n} = \sum_{d|n} \frac{e(d)q^d}{1-q^d}$$
$$= \sum_{d|n} \frac{e(d)}{1-q^d} - \sum_{d|n} e(d).$$

Перепишем равенство (15) в следующем виде

$$\sum_{k=0}^{n-1} a(k)q^k = \sum_{d|n} e(d)(1+q^d+\cdots+q^{n-d}),$$

Заменяя $q^k \to (bk+c)^r q^k$ или $q^k \to (bk+c)^r(-q)^k$ для всех k, приходим к равенствам

$$\sum_{k=0}^{n-1} a(k)(bk+c)^r q^k = \sum_{d|n} e(d) \sum_{i=0}^{\frac{n}{d}-1} (bdi+c)^r q^{di},$$

$$\sum_{k=0}^{n-1} a(k)(bk+c)^r(-q)^k = \sum_{2\nmid d|n} e(d) \sum_{i=0}^{\frac{n}{d}-1} (-1)^i (bdi+c)^r q^{di}$$
$$+ \sum_{2|d|n} e(d) \sum_{i=0}^{\frac{n}{d}-1} (bdi+c)^r q^{di}.$$

Остаётся использовать формулы [**21**]

$$\sum_{i=0}^{n} (bi+c)^r q^i = \frac{b^r}{r+1}\left(q^{n+1}B_{r+1}\left(\frac{c}{b}+n+1,q\right) - B_{r+1}\left(\frac{c}{b},q\right)\right),$$

$$\sum_{i=0}^{n} (-1)^i (bi+c)^r q^i = \frac{b^r}{2}\left((-1)^n q^{n+1}E_r\left(\frac{c}{b}+n+1,q\right) - E_r\left(\frac{c}{b},q\right)\right).$$

Из формул (7), (8) и формулы (14) для $a(k) = m(k)$ и $a(k) = p(k)$ вытекает

Предложение 3.

$$\sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right)\phi_{1-s}(d) = \sum_{d|n}\frac{de(d)}{d^s},$$

$$\frac{1}{n}\sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right)\phi_{1-s}(d) = \sum_{d|n}\frac{e(n/d)}{d^s} \tag{16}$$

или, после замены $s \to s+1$,

$$\sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right)\phi_{-s}(d) = \sum_{d|n}\frac{e(d)}{d^s}, \tag{17}$$

$$\sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right)\phi_{-s}(d) = \sum_{d|n}\frac{n/de(n/d)}{d^s}.$$

Предложения 4-6 являются следствиями Предложения 3 (последовательность $\phi_{-s}(d)$, $d|n$, является обратным преобразованием Мёбиуса последовательности d^{-s}, $d|n$).

Предложение 4. *Если последовательность* z_d, $d|n$, *является обратным преобразованием Мёбиуса последовательности* x_d, $d|n$,

$$z_d = \sum_{d'|d}\mu\left(\frac{d}{d'}\right)x_{d'},$$

то

$$\sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right)z_d = \sum_{d|n} e(d)x_d,$$

$$\sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right)z_d = \sum_{d|n} n/de(n/d)x_d.$$

Обратным преобразованием Мёбиуса последовательности q^d, $d|n$, является последовательность $dM(q,d)$, $d|n$, где $M(q,d)$ – многочлен ожерелий [**13**],

$$M(q,d) = \frac{1}{d}\sum_{d'|d}\mu\left(\frac{d}{d'}\right)q^{d'}.$$

Предложение 5.

$$\sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right)dM(q,d) = \sum_{d|n} e(d)q^d,$$

$$\sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right) dM(q,d) = \sum_{d|n} n/de(n/d)q^d.$$

Применяя логарифмическую производную к обеим частям равенства (2), получим обратное преобразование Мёбиуса

$$\frac{q\Phi'_n(q)}{\Phi_n(q)} = \sum_{d|n} \mu\left(\frac{n}{d}\right) \frac{dq^d}{q^d-1}.$$

Предложение 6.

$$\sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right) \frac{q\Phi'_d(q)}{\Phi_d(q)} = \sum_{d|n} \frac{de(d)q^d}{q^d-1},$$

$$\sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right) \frac{q\Phi'_d(q)}{\Phi_d(q)} = \sum_{d|n} \frac{ne(n/d)q^d}{q^d-1}.$$

Согласно [**14**]

$$\frac{q\Phi'_n(q)}{\Phi_n(q)} = \frac{\sum_{k=1}^n c_n(k)q^k}{q^n-1}. \tag{18}$$

Поэтому из Предложения 6 следует

Предложение 7.

$$\sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right) \frac{\sum_{k=1}^d c_d(k)q^k}{q^d-1} = \sum_{d|n} \frac{de(d)q^d}{q^d-1},$$

$$\sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right) \frac{\sum_{k=1}^d c_d(k)q^k}{q^d-1} = \sum_{d|n} \frac{ne(n/d)q^d}{q^d-1}.$$

3. Обобщённые степенные суммы и кратности корней

Обобщая формулу (14), для формального ряда Дирихле $G(s) = \sum_{k=1}^\infty g(k)k^{-s}$ определим $m_G(k)$, $p_G(k)$, $m^*_G(k)$, $p^*_G(k)$ равенствами

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{m_G(k)}{k^s} = G(s) \sum_{d|n} \frac{e\left(\frac{n}{d}\right)}{d^s},$$

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{p_G(k)}{k^s} = G(s) \sum_{d|n} \frac{de(d)}{d^s}.$$

$$\sum_{k=1}^\infty \frac{m^*_G(k)}{k^s} = G(s) \sum_{d|n} \frac{e(d)}{d^s},$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_G(k)}{k^s} = G(s) \sum_{d|n} \frac{de\left(\frac{n}{d}\right)}{d^s}.$$

Аналогично можно обобщить формулу (15)

$$\sum_{k=1}^{\infty} m_{[G]}(k) q^k = \sum_{k=1}^{\infty} g(k) q^k \sum_{d|n} \frac{e\left(\frac{n}{d}\right)}{[d]_q},$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} p_{[G]}(k) q^k = \sum_{k=1}^{\infty} g(k) q^k \sum_{d|n} \frac{de(d)}{[d]_q}.$$

Предложение 8.

$$G(s) \sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right) \phi_{-s}(d) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{m^*_G(k)}{k^s}.$$

$$\frac{1}{n} G(s) \sum_{d|n} p\left(\frac{n}{d}\right) \phi_{2-s}(d) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_G(k)}{k^s}.$$

Доказательство. Умножаем формулу (17) на $G(s)$ и используем определение $m^*_G(k)$. Формулу (16) после замены $s \to s-1$ умножаем на $G(s)$ и используем определение $p^*_G(k)$.

Предложение 9.

$$G_2(s) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k m_{G_1}(k)}{k^s} = G_1(s-1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s},$$

Доказательство.

$$G_2(s) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k m_{G_1}(k)}{k^s} = G_2(s) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{m_{G_1}(k)}{k^{s-1}}$$

$$= G_2(s) G_1(s-1) \sum_{d|n} \frac{e\left(\frac{n}{d}\right)}{d^{s-1}} = G_1(s-1) G_2(s) \sum_{d|n} \frac{de\left(\frac{n}{d}\right)}{d^s}$$

$$= G_1(s-1) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}.$$

Использованные в Примерах 1-12 формулы представлены в каталоге рядов Дирихле [**10**]. С помощью многих других рядов Дирихле из этого каталога и из [**12**] можно получить аналогичные следствия Предложения 9.

Пример 1.

$$G_1(s) = G_2(s) = \zeta(s).$$

Используя известные формулы [**10**]

$$\frac{1}{\zeta(s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\mu(k)}{k^s},$$

$$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\phi(k)}{k^s},$$

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta(s-1)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\phi^{(-1)}(k)}{k^s},$$

где $\phi(k)$ – функция Эйлера и

$$\phi^{(-1)}(k) = \sum_{d|k} d\mu(d) = \sum_{primep|k} (1-p),$$

получим

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\phi(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*(k)}{k^s}\right),$$

$$m(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} \phi\left(\frac{k}{d}\right) p^*(d)$$

$$= \frac{1}{k}\sum_{d|k}\sum_{(j/d,k/d)=1} p^*(d) = \frac{1}{k}\sum_{d|k}\sum_{(j,k)=d} p^*(d)$$

$$= \frac{1}{k}\sum_{j=1}^{k} p^*((j,k)), k \in \mathbb{N},$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\phi^{(-1)}(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km(k)}{k^s}\right),$$

$$p^*(k) = \sum_{d|k} \phi^{(-1)}\left(\frac{k}{d}\right) dm(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 2. Для фиксированного $r \in \mathbb{N}$

$$G_1(s) = \sum_{d|r} \frac{1}{d^s}, G_2(s) = \zeta(s).$$

Заметим, что для $r = 0$ получаем Пример 1. Согласно [**12**], Th. 5.5.,

$$\frac{G_1(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_k(r)}{k^s}$$

и поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{km_{G_1}(k)}{k^s}=\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{c_k(r)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^*(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k)=\frac{1}{k}\sum_{d|k}c_{k/d}(r)p^*(d), k\in\mathbb{N}.$$

Пример 3. Для фиксированного $r\in\mathbb{N}$

$$G_1(s)=\zeta(s), G_2(s)=\frac{1}{\zeta(rs)}.$$

Согласно [**12**], p. 229,

$$\zeta(s-1)\zeta(rs)=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\rho_r(k)}{k^s}$$

где $\rho_r(k)$ равна сумме делителей d числа k, для которых число k/d является r-й степенью. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{km(k)}{k^s}=\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\rho_r(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m(k)=\frac{1}{k}\sum_{d|k}\rho_r\left(\frac{k}{d}\right)p^*_{G_2}(d), k\in\mathbb{N}.$$

Пример 4. Для фиксированного $r\in\mathbb{N}$

$$G_1(s)=\zeta(s), G_2(s)=\zeta(rs).$$

Согласно [**18**]

$$\frac{\zeta(s-1)}{\zeta(rs)}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\Phi_r(k)}{k^s},$$

где $\Phi_r(k)$ – функция Кли, равная количеству целых чисел j, $1\leqslant j\leqslant k$, для которых $(j,k)_r=1$, $(j,k)_r$ – наибольший общий делитель, являющийся r-й степенью. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{km(k)}{k^s}=\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\Phi_r(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m(k)=\frac{1}{k}\sum_{d|k}\Phi_r\left(\frac{k}{d}\right)p^*_{G_2}(d), k\in\mathbb{N}.$$

Пример 5.

$$G_1(s)=\zeta(s), G_2(s)=\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}.$$

Согласно [**11**], p. 255,

$$\frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\mu(k)|}{k^s}$$

и согласно [**12**], p.229,

$$\frac{\zeta(s-1)\zeta(2s)}{\zeta(s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\beta(k)}{k^s},$$

где $\beta(k)$ равна количеству целых чисел j, $1 \leqslant j \leqslant k$, для которых (j,k) является квадратом. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\beta(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} \beta\left(\frac{k}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 6.

$$G_1(s) = \zeta(s), G_2(s) = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}.$$

Согласно [**12**], p.230,

$$\frac{\zeta(s-1)\zeta(s)}{\zeta(2s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\psi(k)}{k^s},$$

где $\psi(k) = \sum_{d|k} |\mu(k/d)|$ – функция Дедекинда. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\psi(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} \psi\left(\frac{k}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 7.

$$G_1(s) = G_2(s) = \frac{\zeta(2s)}{\zeta(s)}.$$

Согласно [**12**], p. 232,

$$\frac{\zeta(s)\zeta(2(s-1))}{\zeta(s-1)\zeta(2s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(k)\phi(k)}{k^s},$$

где $\lambda(k) = (-1)^{\sum n_i}$ – функция Лиувилля, $k = \prod p_i^{n_i}$ – разложение на простые. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km_{G_1}(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(k)\phi(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} \lambda\left(\frac{k}{d}\right)\phi\left(\frac{k}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 8. Для фиксированного $r \in \mathbb{N}$

$$G_1(s) = \frac{\zeta(2rs)}{\zeta(rs)}, G_2(s) = \frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}.$$

Согласно [**12**], p. 232,

$$\frac{\zeta(2s)\zeta(2r(s-1))}{\zeta(s)\zeta(r(s-1))} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(k)\rho'_r(k)}{k^s},$$

где $\rho'_r(k)$ равна сумме делителей числа k, являющихся r-й степенью. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km_{G_1}(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(k)\rho'_r(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} \lambda\left(\frac{k}{d}\right)\rho'_r\left(\frac{k}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 9. Для фиксированного $r \in \mathbb{N}$

$$G_1(s) = \sum_{d|n} \frac{(r,d)^{s+1}\mu\left(\frac{n}{d}\right)}{d^s}, G_2(s) = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

Согласно [**6**]

$$\zeta(s)G_1(s-1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_n(rk)}{k^s}$$

и поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km_{G_1}(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c_n(rk)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} c_n\left(\frac{rk}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 10.

$$G_1(s) = \sum_{d|n} \frac{\lambda(d)\mu\left(\frac{n}{d}\right)}{d^s}, G_2(s) = \frac{\zeta(s)}{\zeta(2s)}.$$

Согласно [**6**]

$$\frac{\zeta(2s)G_1(s-1)}{\zeta(s)} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(k)c_n(k)}{k^s}$$

и поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km_{G_1}(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\lambda(k)c_n(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} \lambda\left(\frac{k}{d}\right) c_n\left(\frac{k}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 11.

$$G_1(s) = \frac{1}{2^s} - 1, G_2(s) = \frac{1}{\zeta(s)}.$$

Согласно [**19**], p. 21,

$$\zeta(s)G_1(s-1) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^s}$$

и поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km_{G_1}(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} (-1)^{k/d} p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

Пример 12.

$$G_1(s) = \zeta(s)(1 - \frac{1}{2^s}), G_2(s) = 1 - \frac{1}{2^s}.$$

Согласно [**19**], p. 6,

$$\zeta(s-1)\frac{1 - \frac{1}{2^{s-1}}}{1 - \frac{1}{2^s}} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{c(k)}{k^s}$$

где $c(k)$ – наибольший нечётный делитель. Поэтому

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{km_{G_1}(k)}{k^s} = \left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{c(k)}{k^s}\right)\left(\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p^*_{G_2}(k)}{k^s}\right),$$

$$m_{G_1}(k) = \frac{1}{k}\sum_{d|k} c\left(\frac{k}{d}\right) p^*_{G_2}(d), k \in \mathbb{N}.$$

4. Эта-произведение Саито

Эта-произведение Саито $\eta_e(q)$ для функции $e(d)$, $d|n$, определяется формулой [**17**]

$$q^{-\frac{\mu_e}{24}}\eta_e(q) = \prod_{k=1}^{\infty} \zeta_e(q^k) := \bar{\eta}_e(q),$$

где $\mu_e = \sum_{d|n} e(d)$.

Предложение 10.

$$q\frac{d}{dq}\log\bar{\eta}_e(q) = \sum_{d|n} de(d)L(q^d)$$

$$= \sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{kq^k\Phi'_d(q^k)}{\Phi_d(q^k)}$$

$$= \sum_{d|n} m\left(\frac{n}{d}\right)\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sum_{j=1}^{d} c_d(j)q^{kj}}{q^{kd}-1},$$

где

$$L(q) := \sum_{k=1}^{\infty}\frac{kq^k}{1-q^k} = \sum_{m=1}^{\infty}\sigma(m)q^m,$$

$$\sigma(m) := \sum_{d|m} d.$$

Доказательство. Из формулы (3) следует, что

$$\bar{\eta}_e(q) = \prod_{k=1}^{\infty}\prod_{d|n}(1-q^{kd})^{e(d)} = \prod_{k=1}^{\infty}\prod_{d|n}\Phi_d^{m(\frac{n}{d})}(q^k),$$

Применяем оператор $q\frac{d}{dq}\log$ и используем формулу (18).

5. Квазиоднородные особенности

Для квазиоднородной особенности функции трёх переменных с регулярной системой весов $(a,b,c;n)$ известна формула для производящей функции спектральных чисел [**17**]

$$\sum_j q^{m_j} = q^{-n}\frac{(q^n-q^a)(q^n-q^b)(q^n-q^c)}{(q^a-1)(q^b-1)(q^c-1)}.$$

Согласно [**22**] для кратностей $m(k)$ имеем соотношение

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1} m(k)q^k}{q^n-1} = \frac{n^2}{abc}\frac{1}{q-1} - \frac{1}{q^n-1}$$
$$+\frac{(a,n)}{a}\frac{1}{q^{(a,n)}-1} + \frac{(b,n)}{b}\frac{1}{q^{(b,n)}-1} + \frac{(c,n)}{c}\frac{1}{q^{(c,n)}-1}$$
$$-\frac{n(b,c,n)}{bc}\frac{1}{q^{(b,c,n)}-1} - \frac{n(a,c,n)}{ac}\frac{1}{q^{(a,c,n)}-1} - \frac{n(a,b,n)}{ab}\frac{1}{q^{(a,b,n)}-1}.$$

Поэтому

$$\frac{1}{\zeta(s)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{m(k)}{k^s} = \frac{n^2}{abc} - \frac{1}{n^s}$$
$$+\frac{1}{a(a,n)^{s-1}} + \frac{1}{b(b,n)^{s-1}} + \frac{1}{c(c,n)^{s-1}}$$
$$-\frac{n}{bc(b,c,n)^{s-1}} - \frac{n}{ac(a,c,n)^{s-1}} - \frac{n}{ab(a,b,n)^{s-1}}.$$

и из формул (9) и (10) вытекают аналогичные соотношения для степенных сумм $p(k)$

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1} p(k)q^k}{q^n-1} = \frac{n^3}{abc}\frac{1}{q^n-1} - \frac{1}{q-1}$$
$$+\frac{n}{a}\frac{1}{q^{\frac{n}{(a,n)}}-1} + \frac{n}{b}\frac{1}{q^{\frac{n}{(b,n)}}-1} + \frac{n}{c}\frac{1}{q^{\frac{n}{(c,n)}}-1}$$
$$-\frac{n^2}{bc}\frac{1}{q^{\frac{n}{(b,c,n)}}-1} - \frac{n^2}{ac}\frac{1}{q^{\frac{n}{(a,c,n)}}-1} - \frac{n^2}{ab}\frac{1}{q^{\frac{n}{(a,b,n)}}-1},$$

$$\frac{1}{\zeta(s)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{p(k)}{k^s} = \frac{1}{abcn^{s-3}} - 1$$
$$+\frac{(a,n)^s}{an^{s-1}} + \frac{(b,n)^s}{bn^{s-1}} + \frac{(c,n)^s}{cn^{s-1}}$$
$$-\frac{(b,c,n)^s}{bcn^{s-2}} - \frac{(a,c,n)^s}{acn^{s-2}} - \frac{(a,b,n)^s}{abn^{s-2}}.$$

Согласно [**7**] характеристический многочлен монодромии квазиоднородной особенности функции трёх переменных с регулярной системой весов $(a,b,c;n)$ равен

$$\frac{(1-q^n)^{2g-2+r}\prod_{d|n,d\in\{a,b,c\}}(1-q^{n/d})}{(1-q)\prod_{\alpha_i|n}(1-q^{n/\alpha_i})},$$

где $\{g,(\alpha_1,\beta_1),\dots,(\alpha_r,\beta_r)\}$ – инварианты Зейферта особенности, определяемые $\mathbb{C}^*$-действием. Используя формулы (14) и (15) для $a(k)=m(k)$ и $a(k)=p(k)$, получим

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1}m(k)q^k}{q^n-1}=\frac{2g-2+r}{q-1}-\frac{1}{q^n-1}+\sum_{\substack{d|n\\ d\in\{a,b,c\}}}\frac{1}{q^d-1}-\sum_{\alpha_i|n}\frac{1}{q^{\alpha_i}-1},$$

$$\frac{1}{\zeta(s)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{m(k)}{k^s}=2g-2+r-\frac{1}{n^s}+\sum_{\substack{d|n\\ d\in\{a,b,c\}}}\frac{1}{d^s}-\sum_{\alpha_i|n}\frac{1}{\alpha_i^s},$$

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1}p(k)q^k}{q^n-1}=\frac{n(2g-2+r)}{q^n-1}-\frac{1}{q-1}+\sum_{\substack{d|n\\ d\in\{a,b,c\}}}\frac{n/d}{q^{n/d}-1}-\sum_{\alpha_i|n}\frac{n/\alpha_i}{q^{n/\alpha_i}-1},$$

$$\frac{n^{s-1}}{\zeta(s)}\sum_{k=0}^{\infty}\frac{p(k)}{k^s}=2g-2+r-n^{s-1}+\sum_{\substack{d|n\\ d\in\{a,b,c\}}}d^{s-1}-\sum_{\alpha_i|n}\alpha_i^{s-1}.$$

6. Простые и параболические особенности

В этом и следующем параграфах для перечисленных особенностей мы выпишем представления из формулы (15) для рациональных функций

$$\frac{\sum_{k=0}^{n-1}m(k)q^k}{1-q^n},\ \frac{\sum_{k=0}^{n-1}p(k)q^k}{1-q^n}.$$

Для простых особенностей A_l, D_l, E_6, E_7, E_8

$$\sum_{k=0}^{n-1}m(k)q^k=\sum_j q^{m_j},$$

числа m_j совпадают с показателями Кокстера соответствующих конечных групп отражений.

A_l, $n=l+1$,

$$\frac{1}{1-q}-\frac{1}{1-q^n},$$

$$-\frac{1}{1-q}+\frac{n}{1-q^n}.$$

D_l, $n=2l-2$,

$$\frac{1}{1-q}-\frac{1}{1-q^2}+\frac{1}{1-q^{n/2}}-\frac{1}{1-q^n},$$
$$-\frac{1}{1-q}+\frac{2}{1-q^2}-\frac{n/2}{1-q^{n/2}}+\frac{n}{1-q^n}.$$

E_6, $n=12$,

$$\frac{1}{1-q}-\frac{1}{1-q^2}-\frac{1}{1-q^3}+\frac{1}{1-q^4}+\frac{1}{1-q^6}-\frac{1}{1-q^{12}},$$
$$-\frac{1}{1-q}+\frac{2}{1-q^2}+\frac{3}{1-q^3}-\frac{4}{1-q^4}-\frac{6}{1-q^6}+\frac{12}{1-q^{12}}.$$

E_7, $n=18$,

$$\frac{1}{1-q}-\frac{1}{1-q^2}-\frac{1}{1-q^3}+\frac{1}{1-q^6}+\frac{1}{1-q^9}-\frac{1}{1-q^{18}},$$
$$-\frac{1}{1-q}+\frac{2}{1-q^2}+\frac{3}{1-q^3}-\frac{6}{1-q^6}-\frac{9}{1-q^9}+\frac{18}{1-q^{18}}.$$

E_8, $n=30$,

$$\frac{1}{1-q}-\frac{1}{1-q^2}-\frac{1}{1-q^3}-\frac{1}{1-q^5}+\frac{1}{1-q^6}+\frac{1}{1-q^{10}}+\frac{1}{1-q^{15}}-\frac{1}{1-q^{30}},$$
$$-\frac{1}{1-q}+\frac{2}{1-q^2}+\frac{3}{1-q^3}+\frac{5}{1-q^5}-\frac{6}{1-q^6}-\frac{10}{1-q^{10}}-\frac{15}{1-q^{15}}+\frac{30}{1-q^{30}}.$$

$\tilde{E}_6=P_8$, $n=3$,

$$\frac{3}{1-q}-\frac{1}{1-q^3},$$
$$-\frac{1}{1-q}+\frac{9}{1-q^3}.$$

$\tilde{E}_7=X_9$, $n=4$,

$$\frac{2}{1-q}+\frac{1}{1-q^2}-\frac{1}{1-q^4},$$
$$-\frac{1}{1-q}-\frac{2}{1-q^2}+\frac{8}{1-q^4}.$$

$\tilde{E}_8=J_{10}$, $n=6$,

$$\frac{1}{1-q}+\frac{1}{1-q^2}+\frac{1}{1-q^3}-\frac{1}{1-q^6},$$
$$-\frac{1}{1-q}+\frac{2}{1-q^2}+\frac{3}{1-q^4}+\frac{6}{1-q^6}.$$

7. Исключительные особенности Арнольда

U_{12}, $n = 12$,

$$\frac{1}{1-q} + \frac{1}{1-q^3} - \frac{1}{1-q^4} - \frac{1}{1-q^{12}},$$
$$-\frac{1}{1-q} - \frac{3}{1-q^3} + \frac{4}{1-q^4} + \frac{12}{1-q^{12}}.$$

S_{12}, $n = 13$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^{13}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{n}{1-q^{13}}.$$

S_{11}, $n = 16$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} + \frac{1}{1-q^4} - \frac{1}{1-q^{16}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{4}{1-q^4} - \frac{8}{1-q^8} + \frac{16}{1-q^{16}}.$$

Q_{12}, $n = 15$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^3} + \frac{1}{1-q^5} - \frac{1}{1-q^{15}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{3}{1-q^3} - \frac{5}{1-q^5} + \frac{15}{1-q^{15}}.$$

Q_{11}, $n = 18$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} + \frac{1}{1-q^6} - \frac{1}{1-q^{18}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{3}{1-q^3} - \frac{9}{1-q^9} + \frac{18}{1-q^{18}}.$$

Q_{10}, $n = 24$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} - \frac{1}{1-q^3} + \frac{1}{1-q^6} + \frac{1}{1-q^8} - \frac{1}{1-q^{24}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{3}{1-q^3} + \frac{4}{1-q^4} - \frac{8}{1-q^8} - \frac{12}{1-q^{12}} + \frac{24}{1-q^{24}}.$$

W_{13}, $n = 16$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^4} + \frac{1}{1-q^8} - \frac{1}{1-q^{16}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} - \frac{4}{1-q^4} + \frac{16}{1-q^{16}}.$$

W_{12}, $n = 20$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} + \frac{1}{1-q^4} - \frac{1}{1-q^5} + \frac{1}{1-q^{10}} - \frac{1}{1-q^{20}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} - \frac{4}{1-q^4} + \frac{5}{1-q^5} - \frac{10}{1-q^{10}} + \frac{20}{1-q^{20}}.$$

Z_{13}, $n = 18$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^3} + \frac{1}{1-q^9} - \frac{1}{1-q^{18}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} - \frac{6}{1-q^6} + \frac{18}{1-q^{18}}.$$

Z_{12}, $n = 22$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} + \frac{1}{1-q^{11}} - \frac{1}{1-q^{22}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} - \frac{11}{1-q^{11}} + \frac{22}{1-q^{22}}.$$

Z_{11}, $n = 30$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} - \frac{1}{1-q^3} + \frac{1}{1-q^6} + \frac{1}{1-q^{15}} - \frac{1}{1-q^{30}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} + \frac{5}{1-q^5} - \frac{10}{1-q^{10}} - \frac{15}{1-q^{15}} + \frac{30}{1-q^{30}}.$$

E_{14}, $n = 24$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^3} - \frac{1}{1-q^4} + \frac{1}{1-q^8} + \frac{1}{1-q^{12}} - \frac{1}{1-q^{24}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} + \frac{3}{1-q^3} - \frac{6}{1-q^6} - \frac{8}{1-q^8} + \frac{24}{1-q^{24}}.$$

E_{13}, $n = 30$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} - \frac{1}{1-q^5} + \frac{1}{1-q^{10}} + \frac{1}{1-q^{15}} - \frac{1}{1-q^{30}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} + \frac{3}{1-q^3} - \frac{6}{1-q^6} - \frac{15}{1-q^{15}} + \frac{30}{1-q^{30}}.$$

E_{12}, $n = 42$,

$$\frac{1}{1-q} - \frac{1}{1-q^2} - \frac{1}{1-q^3} + \frac{1}{1-q^6} - \frac{1}{1-q^7} + \frac{1}{1-q^{14}} + \frac{1}{1-q^{21}} - \frac{1}{1-q^{42}},$$
$$-\frac{1}{1-q} + \frac{2}{1-q^2} + \frac{3}{1-q^3} - \frac{6}{1-q^6} + \frac{7}{1-q^7} - \frac{14}{1-q^{14}} - \frac{21}{1-q^{21}} + \frac{42}{1-q^{42}}.$$

Список литературы

[1] N. A'Campo, La fonction zeta d'une monodromie, Comment. Math. Helv. 50 (1975), 233-248.

[2] T. Brelivet, C. Hertling, Bernoulli moments of spectral numbers and Hodge numbers, ArXiv math.AG/0405501.

[3] J. M. Burns, R. Suter, Power sums of Coxeter exponents, Adv. in Math. 231 (2012), 1291-1307.

[4] E. Cohen, A class of arithmetical functions, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 41 (1955), 939-944.

[5] E. Cohen, Representations of even functions (modr). I. Arithmetical identities, Duke Math. J. 25 (1958), 401-421.

[6] M. M. Crum, On Some Dirichlet Series, J. London Math. Soc. 15 (1940), 10-15.

[7] W. Ebeling, Poincare series and monodromy of a two-dimensional quasihomogeneous hypersurface singularity, Manuscripta Math. 107 (2002), 271-282.

[8] W. Ebeling, A. Takahashi, Variance of the exponents of orbifold Landau-Ginzburg models, Math. Res. Lett. 20 (2013), 51-65.

[9] C. F. Fowler, S. R. Garcia, G. Karaali, Ramanujan sums as supercharacters, Ramanujan J. 35 (2014), 205-241.

[10] H. W. Gould, T. Shonhiwa, A catalogue of interesting Dirichlet series, Miss. J. Math. Sci. 20 (2008), 1-17.

[11] G. H. Hardy, E. M. Wright, An Introduction to the Theory of Numbers, Oxford University Press, 5th ed., 1979.

[12] P. J. McCarthy, Introduction to arithmetical functions, Springer Verlag, New York, 1986.

[13] N. Metropolis, G.-C. Rota, Witt vectors and the algebra of necklaces, Adv. in Math. 50 (1983), 95-125.

[14] C. A. Nicol, Some formulas involving Ramanujan sums, Canad. J. Math. 14 (1962), 284–286.

[15] C. A. M. Peters, J. H. M. Steenbrink, Mixed Hodge Structures. Ergebnisse der Mathematik und ihrer Grenzgebiete. 3. Folge Volume 52. Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2008.

[16] K. Saito, On the existence of exponents prime to the Coxeter number, J. Algebra 114 (1988), 333-356.

[17] K. Saito, Duality for Regular Systems of Weights, Asian. J. Math. 2 (1998), 983-1048.

[18] U. V. Satyanarayana, K. Pattabhiramasastry, A Note on the Generalized ϕ-function, Math. Student 33 (1965), 81-83.

[19] E. C. Titchmarsh, The Theory of the Riemann Zeta Function, Oxford University Press, 1951.

[20] L. Toth, P. Haukkanen, The discrete Fourier transform of r-even functions, Acta Univ. Sapientiae Math. 3 (2011), 5-25.

[21] W.-P. Wang, W.-W. Wang, Some results on power sums and Apostol-type polynomials, Integral Transforms Spec. Funct. 21 (2010), 307-318.

[22] S. Yasuda, Non-negativity of the Fourier coefficients of eta products associated to regular systems of weights, Publ. Res. Inst. Math. Sci. 46 (2010), 549-563.

E-mail address: ilyuta@mccme.ru